


Vedlegg A: Odontologisk anamnese

I dette vedlegget presenteres resultater fra den odontologiske anamnesen i kartleggingen (se registreringskjemaet del 4). Utvalget er beskrevet nærmere i kapittel 3.1.

A.1 Bor du alene?


I kartleggingen er det registrert bosituasjonen til de undersøkte pasientene, jf. figur A.1. I underkant av 2/3 av utvalget bor sammen med andre personer. Blant pasientene som har svart «Ikke aktuelt» er det en overvekt av barn (0-18 år).



Figur A.1 Bor du alene?¹

¹ N=1988 pasienter.

I figur A.2 ser vi nærmere på bostatusen ved å koble behov for tannbehandling. Figuren viser at behandlingsbehovet er tilnærmet likt uavhengig om pasienten bor alene eller ikke.




Figur A.2 Behov for tannbehandling fordelt etter bosituasjon^{1,2}

¹ N=1927 pasienter.

² Kategorien *Behov* består av pasienter som er vurdert til å ha «behov» og «omfattende» behov for tannlegebehandling, mens kategorien *Ikke behov* består av pasienter som er vurdert til å ha «ikke behov» for tannlegebehandling, jf. figur 11.


A.2 Går du regelmessig til tannlege?

Figur A.3 gir en oversikt over om undersøkte pasienter går regelmessig til tannlege/tannpleier. Figuren viser at 75 pst går regelmessig til tannlegen. Blant de som har svart «Ikke aktuelt» ser vi i datagrunnlaget at omtrent halvparten er barn under 6 år. Ser vi på fordelingen av kjønn er den relativt likt fordelt mellom kvinner og menn.



Figur A.3 Regelmessig tannlegebesøk¹
¹ N= 1987 pasienter.


Figur A.4 viser behovet for tannbehandling fordelt på om pasientene går regelmessig til tannlege eller ikke. Figuren viser at tannbehandlingsbehovet er større dersom pasientene ikke går regelmessig til tannbehandling. Det er særskilt en forskjell i tannbehandlingsbehov som er kategorisert som «omfattende behov».



Figur A.4 Behov for tannbehandling fordelt etter regelmessig tannlegebesøk¹
¹ N=1935 pasienter.

A.3 Hvordan vurderer du tannhelsen din?


I figur A.5 gir en oversikt over egenvurdert tannhelse. De fleste pasientene oppgir at de har god tannhelse. I datagrunnlaget kan vi se at det er jevnt fordelt over aldersgruppene og kjønn.



Figur A.5 Tannhelse¹

¹ N=1861 pasienter.

I figur A.6 går vi nærmere på behovet for tannbehandling og egenvurdert tannhelse. Behovet for tannbehandling øker med dårligere selvrapportert helse.




Figur A.6 Behov for tannbehandling fordelt etter tannhelse^{1,2}

¹ N= 1861 pasienter.

² Kategorien *Behov* består av pasienter som er vurdert til å ha «behov» og «omfattende» behov for tannlegebehandling, mens kategorien *Ikke behov* består av pasienter som er vurdert til å ha «ikke behov» for tannlegebehandling, jf. figur 11.


A.4 Smerter i tennene?

Figur A.7 viser egenvurdert smerte i tennene, munnen eller fra proteser. Vi ser at de fleste ikke opplever slike problemer. Også her er det jevnt fordelt mellom kjønn.



Figur A.7 Smerter i tenner¹
¹ N=1911 pasienter.

I figur A.8 vises hvordan behovet er fordelt blant de som opplever smerter i tenner og behovet for tannbehandling. Behovet er økende med hvor ofte pasienten opplever smerte. Det er imidlertid få observasjoner i kategoriene «Ganske ofte» og «Ofte», som gjør at man må tolke resultatene med varsomhet.




Figur A.8 Behov for tannbehandling fordelt etter smerter i tenner^{1,2}

¹ N= 1911 pasienter.

² Kategorien *Behov* består av pasienter som er vurdert til å ha «behov» og «omfattende» behov for tannlegebehandling, mens kategorien *Ikke behov* består av pasienter som er vurdert til å ha «ikke behov» for tannlegebehandling, jf. figur 11.

A.5 Sårhet på tunge og/eller slimhinner


Figur A.9 viser egenrapportert sårhet på tunge og slimhinne. Vi ser at de fleste ikke opplever å ha slike problemer.



Figur A.9 Sårhet på tunge og/eller slimhinne¹

¹ N=1916 pasienter.

Figur A.10 tar for seg kategoriene i figur A.9 over, men vi ser nå på andelen med behov for tannbehandling. Her ser vi at de som svarer at de opplever sårhet «Av og til» og «Ganske ofte» har et noe lavere behov for tannbehandling. En mulig årsak til dette, kan være at det er veldig få observasjoner på noen av svaralternativene.




Figur A.10 Behov for tannbehandling fordelt etter sårhet på tunge og/eller slimhinne¹

¹ N=1916 pasienter.

² Kategorien *Behov* består av pasienter som er vurdert til å ha «behov» og «omfattende» behov for tannlegebehandling, mens kategorien *Ikke behov* består av pasienter som er vurdert til å ha «ikke behov» for tannlegebehandling, jf. figur 11.

A.6 Dårlig kost?


Figur A.11 viser hvordan vårt utvalg opplever om de har dårlig kost. Vi ser at de fleste ikke opplever at kosten er dårlig på grunn av tenner eller proteser. Også her er det ganske likt fordelt mellom kvinner og menn, relativt til skjevfordelingen i utvalget.



Figur A.11 Dårlig kost¹

¹ N=1890 pasienter.

Figur A.12 viser behovet for tannbehandling betinget av grad av selvopplevd dårlig kost. I kategoriene «Av og til» «Ganske ofte» og «Ofte» er det få observasjoner, og resultatene må tolkes med varsomhet.




Figur A.12 Behov for tannbehandling fordelt etter dårlig kost¹

¹ N=1890 pasienter.

² Kategorien *Behov* består av pasienter som er vurdert til å ha «behov» og «omfattende» behov for tannlegebehandling, mens kategorien *Ikke behov* består av pasienter som er vurdert til å ha «ikke behov» for tannlegebehandling, jf. figur 11.

A.7 Munntørrehet


Figur A.13 gir en oversikt over utvalgets selvopplevd munntørrehet. Vi ser at de fleste «Aldri» eller «Av og til» opplever munntørrehet.



Figur A.13 Munntørrehet¹

¹ N=1902 pasienter.

Figur A.14 viser at behovet er ganske likt fordelt uavhengig av om pasienten opplever munntørrehet eller ikke. Vi ser mulig en svak tendens mot at behovet øker noe om man opplever munntørrehet oftere.



Figur A.14 Behov for tannbehandling fordelt etter munntørrehet¹

¹ N = 1902 pasienter.

² Kategorien *Behov* består av pasienter som er vurdert til å ha «behov» og «omfattende» behov for tannlegebehandling, mens kategorien *Ikke behov* består av pasienter som er vurdert til å ha «ikke behov» for tannlegebehandling, jf. figur 11.